Actualités sur la prise en charge des prolapsus : Les prothèses, les voies d'abord

Pr Michel COSSON
Université médecine Lille 2
Hopital Jeanne de Flandres,
CHRU Lille

Ne pas opérer

- Les prolapsus ou IUE bien tolérées
- Les prolapsus ou IUE minimales
- Les patientes désirant encore une grossesse sauf si gêne +++
- Les patientes avec un risque chirurgical trop important
- Les patientes hésitantes

Traitement chirurgical des troubles de la statique pelvienne

- Réaliser une information détaillée des échecs et complications possibles ++
 - une conservation de l'utérus est toujours possible
 - Une abstention est toujours possible
 - prendre le temps +++
 - du bilan
 - de la réflexion

Traitement chirurgical des prolapsus s'adapter aux réalités

- Les réalités de la patiente
 - obésité
 - antécédents chirurgicaux
 - prothèses de hanche
 - défauts masqués
 - qualité des tissus disponibles
 - Volume du prolapsus

Actualités traitement chirurgical des prolapsus

- Voies hautes
 - cœlioscopie ++
- Voies basses +++
 - intervention de Richter
 - cure IUE : TVT, TOT, TVT O
 - Kits prothétiques

Pas d'indications standardisées mais prédominance voie vaginale

Surgical Approaches for POP – NHS England and France

Procedures for POP in NHS England: 2004 / 05

Surgical approaches for POP in France: 2004

Traitement chirurgical des prolapsus Voie Haute

- Voie haute avant 60 ans Cœlioscopie possible 90%
 - prothèse antérieure et postérieure
 - promontofixation
 - douglasectomie
 - association possible :
 - hystérectomie subtotale, myorrhaphie des éleveurs, rectopexie, geste urinaire

Résultats anatomiques

I. Prolapsus du fond vaginal : plus de récurrences pour la voie vaginale

Récidives de prolapsus du fond vaginal

(Durée suivi)

Traitement chirurgical des prolapsus Voie Haute

- 10-20 % échecs, 30% IUE secondaire
- Difficultés Coelioscopie ++
Complications laparotomie
- Utilisation de prothèses : prix, asepsie, risques infectieux
- fréquence troubles digestifs postop
- douleurs périnéales associées en cas de myorrhaphie

Promontofixation coelioscopique:

Kamina

Promontofixation coelioscopique

- Challenge pour les équipes de bloc opératoire +++
 - Matériel ++ colonne coelio, manipulateur utérin, coagulation section, morcellateur, porte aiguilles, agrafes
 - Changement instruments ++
 - Durée opératoire, apprentissage ++
- Notion de check liste et évènements indésirables +++

Promontofixation coelioscopique

- Prise en charge multidisciplinaire +++
 - Anesthésistes
 - Opérateur, aide opératoire
 - Instrumentiste
 - Matériel, maintenance

Assistance à l'accès coelio

Technique de la promontofixation coelioscopique

Incision Peritonéale

Dissection Antérieure

Dissection postérieure

Laparoscopic recto vaginal dissection

Laparoscopic vesico vaginal dissection

Mise en place des prothèses

Prothèse postérieure

Péritonisation

Prothèse antérieure

Dissection du promontoire coelio

Promontofixation = facile techniquement ? Reproductible ?

Courbe apprentissage ++

Reproductibilité ? Très nb variations techniques:
1 prothèse/2 prothèses, sutures/tackers, localisation des
sutures, taille et forme des prothèses

Durée opératoire ++

269 min [Paraiso, Am J Obstet Gynecol, 2005]

171 min [Gadonneix, J Am Assoc Gyn Laparosc, 2004]

97 min [Rozet, Eur Urol, 2005]

Système DA VINCI® ?

MAYO Clinic [Di Marco, 2004]

...pas utilisé en routine

Efficacité à court terme de la promontofixation coelioscopique ?

Suivi 14 mois pf coelio [Rozet, 2005]

Satisfaction	96%
Récidive	4%

2 ans suivi pf coelio [Gadonneix, 2004]

Récidive cystocèle stade 2 ou plus	8%
Récidive hysteroçèle stade 2 ou plus	8%
Récidive rectocèle stade 2 ou plus	(Burch associé)

2 ans suivi prothèse voie vaginale [de Teyrac, 2005]

Récidive rectocèle stade 2 ou plus	3%
------------------------------------	----

Efficacité de la PF Coelio à long terme ?

5 ans suivi

Promontofixation pour prolapsus apex [Higgs, 2005] (Ross, 2005)

Récidive apex	6%
Rectocèle/cystocèle avec 50% stade 2 ou plus	40%

Satisfaction patientes [Higgs, 2005]	65%
--------------------------------------	-----

La persistance de symptômes préop et l'apparition de symptômes post op explique ces chiffres élevés

Symptômes de novo après chirurgie du prolapsus

	Incidence of de novo symptoms [Maher 2004]		
	Symptomatic SUI	Urge / Detrusor overactivity	Dyspareunia
Abdominal Sacrocolpopexy	9%	33%	11%
Sacrospinous colpopexy	33%	21%	18%

Conclusion

Promontofixation laparo = gold standard en France

Pas de preuve scientifique validant la voie coelioscopique

Promontofixation coelioscopique avant 50 ans

Voie vaginale après 60 ans avec prothèses le plus souvent...

Avantages de la voie vaginale

- Accès direct aux défauts, ligaments pelviens ATFP, Lig Sacro Epineux
- Mortalité et morbidité 3 fois moindres / laparotomie (VH) = Coelio
- Résultats / Incontinence urinaire : TVT, TOT, TVT O

Limites de la chirurgie vaginale

- Installation : 2 assistants
- Large dissections : hémorragies
- Difficultés de la suspension par aiguilles : Richter, Suspension paravaginale
- Douleurs périnéales après myorrhaphies
- Cicatrices vaginales chez les femmes jeunes
- Difficultés en cas de prolapsus de petit volume

Traitement chirurgical des prolapsus : Voie basse

- Voie basse après 60 ans
anesthésie locorégionale
 - Suspension sous vésicale
 - Richter, Richardson
 - Myorrhaphie des élévateurs
 - association possible :
 - hystérectomie totale
 - rectopexie
 - geste urinaire +++

Suspension au ligament sacroépineux selon Richter

Suspension du fond vaginal par une bandelette vaginale

Traitement chirurgical des prolapsus Voie vaginale

- Voie basse
 - 3 jours hospitalisation
 - Deux mois précautions efforts, sport
 - douleurs périnéales
 - sondage urinaire 24 h
 - leucorrhées 3 semaines
 - 20% échec / prolapsus et IUE

NICE (National Institute for Health
and Clinical Excellence) and Aberdeen University review

NHS
National Institute for
Health and Clinical Excellence

49 studies
4569 patients treated
with vaginal mesh/graft

Systematic review of the efficacy
and safety of using mesh or grafts
in surgery for anterior and/or
posterior vaginal wall prolapse

Xueli Jia, Cathryn Glazener, Graham Mowatt,
Graeme MacLennan, Cynthia Fraser, Jennifer
Burr

6 RCT's (full text)
11 RCT's (abstracts)
7 NR comparative
1 prospect. registry
24 case series

Objective failure rate:

-abs.mesh : 23%
-biol. graft : 18%
-non abs. Mesh : 9%

October 2007

Marché 2009 des MIS KITS (Minimal Invasive Surgical Kits)

- **Ethicon, Women's Health & Urology**
 - Prolift Ant™, Prolift Post™ et Prolift Total™
- **AMS**
 - Apogee, Perigee (IntePro™, InteXen LP™)
- **BARD**
 - Avaulta™ Antérieur, Avaulta™ Post
(synthétique ou Hybride)
- **COUSIN BIOTECH**
 - Biomesh Soft
- **PROMEDON**
 - Nazca TC, Nazca R

Prolift™

Prothèse en polypropylène Gynemesh Soft™ (monofilament larges pores) prédécoupée au laser.

Prolift antérieur

Prolift postérieur

Incision de toute l'épaisseur vaginale

- Garder le fascia avec la muqueuse
- Pas de résection vaginale
- Pas d'incision antérieure en T
- Pas de suspension du vagin à la prothèse
- Suspension de l'utérus au fil non résorbable si conservation utérine

Prolift Antérieur

- Large dissection de l'espace paravésical
- Passage du bras proximal

Prolift Antérieur

■ Bras distal

- Plus difficile
- Passage vertical ++
- Aveugle deux cm puis sous contrôle du doigt
- Un cm en avant de l'épine sciatique

Prolift Total

Conclusion: rôle des kits ?

- Amélioration de la sécurité des procédures
- Peu de complication per op (% à l'expérience)
- Procédure peu douloureuse
- Peu de cas d'événements post op sérieux
- Diminution de la durée d'hospitalisation
- Diminution des expositions (infiltration, sutures non ischémiantes, éviter HV et colpectomies, procédure plus rapide)
- Peu d'études comparatives
- De + en + de produits sans étude

Actualités prothèses

- Matériaux résorbables
Abandonnés actuellement
- Matériaux sur le marché :
PP mono filaments tricotés
Variations densité
- Matériaux composites ? :
Prolift +M

GYNECARE GYNEMESH M™ PS

GYNECARE GYNEMESH M™ : PROLENE* Polypropylene Suture & MONOCRYL* (poliglecaprone 25)

Pre-Absorption

Post-Absorption

Pre-Absorption:

- 57 g/cm² density
- 2.5 mm pore size
- Flexibility:**
- 454 g /cm lateral
- 139 g/cm longitudinal

Impact de dégradation

- Augmente taille pore
- Augmente Flexibilité
- Diminution densité

Post Absorption:

- 28 g/cm² density
- 4.0 mm pore size
- Flexibility:**
- 179 g /cm lateral
- 18 g/cm longitudinal

1. Cobb W et al. Textile Analysis of Heavy-weight, middle-weight and light-weight Polypropylene in Porcine Ventral Hernia Repair. Journal of Surgical Research. 2006, 136: 1-7.

Analyse des propriétés matériaux

			ETHICON	ETHICON	ETHICON	AMS	AMS	BARD	BOSTON SCI.
Characteristic	Otherwise known as	Units	GYNEMESH™ PS	GYNEMESH M™ Pre-Absorption	GYNEMESH M™ Post Absorption	Apogee/ Intepro Lite	Perigee / Intepro Lite	Avaulta	Pinnacle/ Polyform
Area Weight	Lightness	g/m ²	43 (n=10)	57 (n=10)	28 (n=10)	Arm 104 Body 26	Arm 104 Body 26	98 (n=5)	41 (n=10)
Largest Pore Size (n=5)	Tissue Integration	mm	2.4	2.5	4.0	Arm 1.3 Body 2.4	Arm 1.3 Body 2.4	1.5	1.5
Porosity	% air	%	66.5 (n=6)	68.3 (n=5)	72.3 (n=3)	68.1 (n=3)	68.1 (n=3)	46.2 (n=2)	61 (n=3)
Bending Stiffness-Body	Lateral Flexibility	mg-cm	106	454	179	24.2	19.6	663	278
	Longitudinal Flexibility		200 (n=10)	139 (n=10)	18 (n=5)	24.2	19.6	663 (n=5)	125 (n=5)

Data on file: ETHICON, INC.

Taille des pores avant et après cicatrisation

Non dégradée

Dégradée

Meilleure biocompatibilité avec le vagin et élasticité longitudinale

- Avantage concernant la force latérale, meilleur support
- Propriétés mécaniques permettant de retrouver l'élasticité physiologique du vagin

↔ Resistance
↔ Elongation

Les critères de sélection opératoire

- Le choix de la méthode
 - voie abdominale : jeunes femmes moins 50 ans
 - voie vaginale : plus de 60 ans
 - Techniques prothétiques voie basse : en évaluation
risque de récurrence élevé ou première intention ?
- Avantage voie basse
 - Cystocèle volumineuse, atcd chirurgie voie haute, obèses
 - anesthésie locorégionale