



**GEL ANTI-ADHÉRENTIEL
OXIPLEX AP & IU**

**EN PRÉVENTION
DES ADHÉRENCES
POSTCHIRURGICALES**

SURGYNAL®
une expertise, des solutions

www.surgynal.com

Info@surgynal.com

5 chemin du Jubin

69570 DARDILLY [France]

Tél. : +33 (0)4 72 53 81 58

Fax : +33 (0)4 72 54 65 05

OXIPLIX

GEL ANTI-ADHÉRENTIEL OXIplex AP & IU

La plupart des patients développent des adhésions postchirurgicales majeures.

Dans 71 % des cas, des adhésions postopératoires interviennent dans les complications liées aux procédures chirurgicales réalisées par voie abdominale.

Après une chirurgie gynécologique plusieurs conséquences cliniques peuvent être constatées :

- Occlusions
- Infertilité
- Douleurs pelviennes chroniques
- ...

On peut constater une augmentation de 45 % du taux de grossesse chez les patientes ayant été traitées par Oxiplex.

LES AVANTAGES DE OXIplex :

- Un kit dédié à l'utilisation intra-utérine
- Facile à appliquer
- Conditionnement à Température ambiante

LES CHAMPS D'APPLICATION DU GEL OXIplex :

- Colonne vertébrale
- Cavité péritonéale
- Cavité intra-utérine
- Tendons
- Nerf périphériques

RÉFÉRENCES

Oxiplex AP Réf FPC-09012


2 seringues de 20ml chacune avec un applicateur rigide, fenêtré de 30cm

Oxiplex IU Réf FPC-09017

1 seringue de 10ml avec un applicateur semi-rigide de 15cm



Produit anti-adhérentiel jouant son rôle de barrière



Formation d'adhérences sans produit anti-adhérentiel




image d'illustration



 SE CONSERVE
À TEMPÉRATURE
AMBIANTE